



予防接種の一覧表

平成 31 年 4 月 1 日改訂

定期接種（無料）；受けるべき予防接種です。

予防接種の種類	対象期間	標準的な接種年齢	接種回数・間隔	
BCG	生後 12 ヶ月未満	生後 5 ヶ月～8 ヶ月	1 回	
ヒブ (インフルエンザ菌 b 型)	生後 2 ヶ月～5 歳未満 生後 2 ヶ月～7 ヶ月未満で開始が標準	○生後 2～7 ヶ月未満で開始した場合 4～8 週間隔で 3 回、3 回目から 7～13 ヶ月の間 (1 才以後) に 1 回 ○生後 7 ヶ月以上、1 歳未満で開始した場合 4～8 週間隔で 2 回、2 回目から 7～13 ヶ月の間 (1 才以後) に 1 回 ○1 歳以上、5 歳未満で開始した場合 1 回のみ		
肺炎球菌	生後 2 ヶ月～5 歳未満 生後 2 ヶ月～7 ヶ月未満で開始が標準	○生後 2～7 ヶ月未満で開始した場合 1 歳までに 4 週以上の間隔で 3 回、3 回目から 60 日以上あけて 12～15 ヶ月未満で 1 回 ○生後 7 ヶ月以上、1 歳未満で開始した場合 4 週以上の間隔で 2 回、2 回目から 60 日以上あけて 1 歳～2 歳未満に 1 回 ○1 歳以上、2 歳未満で開始した場合 60 日以上の間隔で 2 回 ○2 歳以上、5 歳未満で開始した場合 1 回のみ		
四種混合 (DPT-IPV) ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオのワクチン	1 期 初回	生後 3 ヶ月～90 ヶ月未満	生後 3 ヶ月～12 ヶ月未満	3～8 週間隔で 3 回
	1 期 追加	生後 3 ヶ月～90 ヶ月未満で 1 期初回 (3 回) 終了後 6 ヶ月以上の間隔をあけて	1 期初回 (3 回) 終了後 12 ヶ月～18 ヶ月未満	1 回
二種混合 (DT)	2 期	11 歳～13 歳未満	小学 6 年生	1 回
麻疹風疹 (MR)	1 期	生後 12 ヶ月～24 ヶ月未満		1 回
	2 期	5 歳～7 歳未満で小学校就学前 1 年間		1 回

※ ワクチン同士の間隔について

不活化ワクチンを受けた後に、別の種類のワクチンを受けるには 1 週間以上 (中 6 日) 以上あける。
生ワクチンを受けた後に、別の種類のワクチンを受けるには 4 週間以上 (中 27 日) 以上あける。

不活化ワクチン： ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン、B 型肝炎ワクチン、四種混合、日本脳炎、二種混合、インフルエンザ、子宮頸がんワクチン

生ワクチン： ロタウイルスワクチン、BCG、麻疹風疹、水痘、おたふくかぜ



定期接種のつづき

日本脳炎	1 期初回	生後 6 ヶ月～90 ヶ月未満	3 歳	1～4 週間隔で 2 回
	1 期追加	生後 6 ヶ月～90 ヶ月未満で 1 期初回後おおむね 1 年以上	4 歳	1 回
	2 期	9 歳～13 歳未満	小学 4 年生	1 回
	<ul style="list-style-type: none"> 平成 7(1995)年 4 月 2 日から平成 19(2007)年 4 月 1 日生まれの方 →20 歳になるまでの間に未接種分を接種できます。 平成 19(2007)年 4 月 2 日から平成 21(2009)年 10 月 1 日生まれの方 →1 期の 3 回の接種を終了できていなかった場合、2 期の接種期間(9 歳以上 13 歳未満)に 1 期の未接種分を接種できます。 			
水痘	生後 12 ヶ月から生後 36 ヶ月未満 (1 才～3 才未満)		3 ヶ月以上の間隔をあけて2回接種 標準は、生後 12 ヶ月～15 ヶ月未満に 1 回目を行い、 1 回目のあと 6 ヶ月～12 ヶ月の間隔をあけて 2 回目	
B 型肝炎	生後 2 ヶ月から接種し、1 歳の誕生日の前日までに完了する		4 週間隔で 2 回、更に、初回接種から 20～24 週後 (約 5～6 ヶ月後) に 1 回	
子宮頸がん	小学 6 年生～高校 1 年生相当の年齢	標準的な接種年齢は中学 1 年生		1 回目 0 月として、以降 1 ヶ月後、6 ヶ月後の計 3 回 (サーバリックス)
サーバリックスあるいはガーダシルから選択 ※副反応の問題で積極的勧奨はない状態			1 回目 0 月として、以降 2 ヶ月後、6 ヶ月後の計 3 回 (ガーダシル)	

任意接種 (有料) ; 受けるか受けないかは各自の判断によります。

予防接種の種類	対象期間	標準的な接種年齢	接種回数・間隔
おたふくかぜ	1 歳以上	1 歳すぎに 1 回、その後 5 歳以上 7 才未満に 2 回目	2 回が望ましい ※左記の期間を過ぎても接種可
ロタウイルス 胃腸炎 ※ロタリックスとロタテックから、どちらかを選択	① ロタリックス 生後 6 週から生後 24 週	初回接種は生後 14 週 6 日 (約 3 ヶ月半) までが推奨	生後 6 週 (1 ヶ月半くらい) から 4 週間以上の間隔をあけて生後 24 週 (5 ヶ月半くらい) までに 2 回 飲む
	② ロタテック 生後 6 週から生後 32 週	初回接種は生後 14 週 6 日 (約 3 ヶ月半) までが推奨	生後 6 週 (1 ヶ月半くらい) から 4 週間以上の間隔をあけて生後 32 週 (8 ヶ月くらい) までに 3 回 飲む
インフルエンザ	生後 6 ヶ月以上		13 歳未満では 2～4 週間あけて 2 回 13 歳以上では 1 回

